

ПалеоМир

**Чекарда:
следы исчезнувшего леса**

**Антикварные
динозавры**

**Интервью:
писатель Г. Прашкевич
художник А. Бенето**

Саратов – родина мозазавров

Два года назад в газетах промелькнуло забавное сообщение о новом виде плезиозавров. Остатки рептилии почти сорок лет назад нашел японский школьник.

Как положено, он связался с палеонтологами. Те прибыли на место и обнаружили целый скелет ящера. Его полностью извлекли из породы, подготовили для детального изучения, но этому постоянно что-то мешало.

Шли годы... Мальчик сам стал палеонтологом, специалистом по аммонитам. Он, наверное, забыл о плезиозавре, как вдруг ящера, наконец, описали и назвали в его честь футабуразавром Сузуки (*Futabasaurus suzukii*). На это в общей сложности потратили 38 лет.

Такая история не редкость и даже вполне заурядна. Находки могут лежать годами, если не десятилетиями, дожидаясь внимания специалистов. Конечно, это случается не только в Японии. В отечественной палеонтологии тоже есть подобные истории. Одна из них завершилась совсем недавно, хотя началась еще в конце прошлого тысячелетия.



Иллюстрация Дмитрия Богданова

В Саратове, на склоне большой Лысой горы когда-то добывали песок. В результате получился небольшой карьер, сейчас заросший травой и большей частью осыпавшийся. Сюда иногда приходят любители палеонтологии и разные детские геологические экскурсии. В некоторых местах карьера на поверхность выходит небольшой фосфоритовый прослой, образовавшийся в прибрежной зоне мелового моря. В нем встречаются мелкие окатанные косточки птерозавров, черепах и плезиозавров. В 1993 году юный геолог А. Лапкин отыскал здесь обломок какой-то непонятной кости шести сантиметров в длину. Спустя некоторое время находка попала на кафедру геологии Саратовского университета, оттуда отправилась в Палеонтологический институт в Москве, затем - в Зоологический институт в Санкт-Петербурге.

Было понятно, что это черепная кость какой-то морской рептилии, вероятно, близкой к мозазаврам. В таком случае она представляла огромный интерес, потому что была обнаружена в сеноманских отложениях, образовавшихся в самом начале позднемеловой эпохи. Однако с описанием не торопились. Шли годы...

В 2009 году звезды, наконец, сошлись нужным образом, и рептилию описали. Статья была опубликована в третьем номере "Палеонтологического журнала" за нынешний год. В ней сказано, что саратовская кость принадлежит наиболее древнему из всех известных на настоящий момент мозазавров.

Саратовский ящер жил около 95 миллионов лет назад. Он был небольшого размера, около двух метров в длину. Наиболее близкими к нему оказались тоже довольно ранние техасские мозазавры русселозавры (*Russellosaurus*). ■

Русселозавр